

# 調查糧食作物病蟲害發生警報

農業部苗栗區農業改良場

中華民國 114 年 09 月日發佈

第 號

印刷品

本件請速轉知農民

貼  
郵

啟

## 警報發佈內容

一、病蟲害別：瘤野螟

二、防治地點、時期：

縣市別	鄉鎮別	防治時期
苗栗縣	各鄉鎮市稻作栽培區	分蘖初期至分蘖盛期

三、防治瘤野螟藥劑及方法：

- (1) 50%芬殺松乳劑 1,000 倍。
- (2) 19%矽護芬水基乳劑。
- (3) 6%培丹粒劑(每公頃 20 公斤)。
- (4) 蘇力菌 1000 倍

相關核准登記藥劑或施藥注意事項請詳參農藥資訊網

(<https://pesticide.aphia.gov.tw/information/>)。

四、防治應注意事項：

(1)每年 9 至 10 月間，隨著東北季風的到來，瘤野螟族群會開始往南遷飛。初孵化幼蟲遷移至未完全展開葉片基部取食，多數於 3 歲幼蟲開始將水稻成熟葉片中段縱捲成苞，藏身其內取食葉片上表皮及葉肉組織。成蛾偏好施氮肥過多的稻田，捲葉情形明顯高於合理化施肥的稻田。二期稻作面臨分蘖盛期造成白葉及抽穗後危害劍葉(為稻穗主要養分來源)的 2 個階段影響，造成稻株生長及稻穗稔實。應行合理化施肥及防治時機的掌握等，方能降低瘤野螟對於水稻生產的危害。

(2)用藥時請注意使用倍數及安全採收期，以免農藥殘留過量。

農友如果有任何技術上的疑問，可以直接洽詢苗栗區農業改良場諮詢專線 037-236583 或病蟲害診斷專線 037-236619，或各鄉鎮市公所、農會。